

關於 保護兒童免受麻疹侵害的常見問題

關於麻疹的常見問題

Q 麻疹會讓人生病嗎？

是的。麻疹可能非常嚴重，並可能導致嚴重的併發症，甚至導致死亡。例如，每 5 名未接種疫苗且感染麻疹的兒童當中，約有 1 名需要住院治療；每 20 名當中約有 1 名可能罹患肺炎；每 1,000 人當中約有 1 人會出現危及生命的腦部腫脹。

Q 麻疹有哪些症狀？

麻疹的症狀通常在接觸病毒後 7 到 14 天出現。常見症狀包括高燒、咳嗽、流鼻涕、皮疹，以及眼睛發紅、雙眼流淚。麻疹的皮疹症狀通常在發燒開始後幾天內出現，首先出現在臉部，然後向下擴散至全身。

Q 如果有人感染麻疹，可以接受治療嗎？

麻疹目前沒有特定的治療方法或根治方式。醫療照護主要著重於緩解症狀與支持性照護。預防孩子感染麻疹的最佳方式，是確保他們接種 MMR（麻疹、腮腺炎、風疹）疫苗。

Q 如果我懷疑孩子曾接觸過麻疹，該怎麼辦？

您可能會接到衛生部門的來電，告知您的孩子可能會接觸過麻疹。請依照衛生部門的指示行事。如果您的孩子開始出現麻疹症狀，請立即致電孩子的醫生或醫院，以便他們告知您後續該如何處理。前往就醫前請先致電，以確保醫療機構已做好準備，讓您能安全就診。

關於 MMR 疫苗接種的常見問題

Q MMR 疫苗是否安全？我們如何得知？

是的。自從 MMR 疫苗在 50 多年前獲得核准並正式上市以來，已有數百萬名兒童安全地接種了該疫苗。Centers for Disease Control and Prevention（CDC，疾病控制與預防中心）和 Food and Drug Administration（FDA，食品藥品管理局）透過多項安全監測系統進行持續監測並確保疫苗的安全性。此外，MMR 疫苗的安全性已在全球範圍內獲得驗證。

Q MMR 疫苗接種有哪些副作用或風險？

接種 MMR 疫苗後，您的孩子可能會出現輕微副作用，例如注射部位疼痛、發燒或皮疹。這些症狀通常只會持續幾天，並會自行消退。較嚴重的副作用雖然罕見，但可能包括高燒，並可能引發熱性痙攣。一般認為，熱性痙攣不會造成任何永久性傷害，也不會留下長期後遺症。

Q 接種 MMR 疫苗後會有任何長期風險嗎？

我們對 MMR 疫苗已有數十年的使用經驗，目前沒有證據顯示它會造成長期傷害。

Q 像 MMR 這類疫苗會導致自閉症嗎？

已有針對數十萬名兒童進行的大規模研究顯示，疫苗與自閉症之間並無關聯。

進一步瞭解兒童疫苗：



關於
麻疹的常見問題
[cdc.gov/measles/
about/questions.html](https://cdc.gov/measles/about/questions.html)



關於
您孩子的疫苗
[cdc.gov/vaccines-
children/about/
index.html](https://cdc.gov/vaccines-children/about/index.html)

關於 MMR 疫苗接種的常見問題

Q MMR 疫苗的效力如何？

MMR 疫苗的效力非常高。接種兩劑後，約有 97% 的人能獲得對麻疹的防護。接種過疫苗的人雖然極少會感染麻疹，但仍有可能發生。不過，他們將疾病傳播給他人的概率較低。此外，他們的病情通常較輕，併發症也較少。

Q 如果我不讓孩子接種疫苗，他們真的會面臨感染麻疹的風險嗎？

麻疹極易傳播，是全球傳染性最強的疾病之一。任何未對麻疹產生免疫保護的人都面臨感染風險。隨著旅行次數增加及疫苗接種率下降，我們已觀察到麻疹病例數有所上升，這使得 MMR 的接種變得更加重要。

Q 我們全家正計劃一趟國際旅行。該如何保護孩子免於感染麻疹？

由於麻疹疫情在全球各地均有發生，因此在國際旅行前，全家人都應透過接種 MMR 疫苗來預防麻疹。相關建議包括：6 至 11 個月大的嬰兒可接種一劑 MMR 疫苗；12 個月大及以上的兒童、青少年以及尚未完成接種的成年人，則應接種兩劑（兩劑間隔 28 天）。在出發前至少 2 週接種疫苗，能提供最佳的麻疹防護效果。

Q 嬰兒出生時是否對麻疹具有免疫力？

當嬰兒出生時，如果母親對麻疹具有免疫力，嬰兒會從母親的抗體中獲得一定的保護：這種保護在出生後的頭幾個月內有效，但會隨著時間逐漸減弱。接種疫苗（例如 MMR 疫苗）是一種安全的方法，能幫助孩子建立免疫力，同時避免感染麻疹的風險。

Q 為什麼嬰兒需要這麼小就接種 MMR 疫苗？

我們建議在生命早期接種疫苗，以在嬰兒和兒童面臨麻疹等嚴重疾病之前提供保護。兒童通常在 12 至 15 個月大時接種第一劑 MMR 疫苗，因為此時來自母親的抗體所提供的保護作用已逐漸消退。在這個年齡段，若兒童感染麻疹，出現嚴重併發症的風險會較高。

Q 嬰兒的身體會因為一次接種這麼多疫苗而負荷過重嗎？

不會。健康的嬰兒每天都要對抗成千上萬的病原體。疫苗利用抗原——即病原體的某些成分——促使人體免疫系統產生抗體，以對抗疾病。即使嬰兒在同一天接種多種疫苗，疫苗中所含的抗原量，也僅占嬰兒每天在環境中接觸到的抗原量的一小部分。

Q 我的孩子現在生病了。今天還能去打疫苗嗎？

請告訴我您孩子的病情。何時開始發病？有哪些症狀？通常，即使孩子患有輕微疾病，例如感冒、耳痛、輕微發燒或腹瀉，仍可接種疫苗。請注意，若孩子只是輕微生病而延後接種疫苗，對健康並無任何益處。讓孩子按時接種疫苗非常重要，這樣才能獲得對抗嚴重疾病的保護。

進一步瞭解兒童疫苗：



關於
麻疹的常見問題
[cdc.gov/measles/
about/questions.html](https://cdc.gov/measles/about/questions.html)



關於
您孩子的疫苗
[cdc.gov/vaccines -
children/about/
index.html](https://cdc.gov/vaccines-children/about/index.html)