

ПОДОЗРЕВАЕТЕ, ЧТО РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ КОРЬЮ?

Что делать, если вы подозреваете у ребенка корь

Обычно корь начинается с высокой температуры, кашля, насморка и покраснения глаз, а затем появляется сыпь. Если у кого-то из членов семьи появились симптомы кори, следуйте рекомендациям ниже.

Изолируйте заболевшего от здоровых членов семьи.

Все сожители больного должны оставаться дома, чтобы не заразить соседей или других людей вне вашего жилища.


Немедленно позвоните врачу или в больницу и сообщите, что ваш сожитель, вероятно, заболел корью. Медицинский работник подскажет, что делать дальше.



Когда следует обратиться в отделение неотложной помощи

Если состояние больного быстро ухудшается или у него появился любой из симптомов ниже, сразу отвезите его в отделение неотложной помощи.

НЕ МЕДЛИТЕ.



Затрудненное (или учащенное) дыхание



Боль при дыхании или кашле



Обезвоживание (сухость в носу и во рту, более редкое мочеиспускание, плач без слез)



Высокая температура или головная боль, которые не проходят



Спутанность сознания, снижение реакции или сильная слабость



Посинение кожи вокруг рта, вялость или трудности при кормлении (у маленьких детей)

Попросите кого-нибудь позвонить в больницу перед вашим визитом. Предупредите персонал, что ребенок может быть болен корью.

ПОДРОБНЕЕ О КОРИ
cdc.gov/measles

