

SA PALAGAY BA NINYO, ANG INYONG ANAK AY MAY TIGDAS?

Ano ang dapat ninyong gawin kung sa palagay ninyo ay may tigdas ang inyong anak

Karaniwang nagsisimula ang tigdas sa lagnat, ubo, tumutulong sipon, at namumulang mata na humahantong sa pamamantal. Kung may mga sintomas ng tigdas ang isang tao sa inyong pamilya:

Ilayo siya sa mga miyembro ng pamilya na walang sakit.

Ang lahat ng tao sa bahay ay dapat manatili sa tahanan upang hindi mahawahan ng sakit ang inyong mga kapitbahay o tao sa labas ng inyong tahanan.

Tumawag sa doktor o ospital agad-agad upang ipaalam sa kanila na mayroong taong may tigdas sa inyong tahanan. Bibigyan nila kayo ng tagubilin.



Kailan dapat pumunta sa emergency room

Kung mabilis na lumala ang taong maysakit o mayroon siya ng alinman sa mga sintomas sa ibaba, dalhin siya kaagad sa kagawarang pang-emergency ng isang ospital.

HUWAG NANG MAGHINTAY PA.



Problema sa paghinga
(o humihinga nang mas mabilis kaysa normal)



May masakit kapag humihinga o umuubo




Nade-dehydrate
(nanunuyo ang ilong at bibig, nabawasan ang pag-ihi, umiiyak nang walang luha)



Ayaw huminto ng lagnat o sakit ng ulo



Nalilito, nabawasan ang pagkaalerto, o malubhang nanghihina



Nangangasul ang paligid ng bibig, mababa ang enerhiya, o nahihirapang kumain
(para sa maliliit na bata)

Patawagin ang isang tao bago kayo dumating. Ipaalam sa ospital na may darating na taong may tigdas.

MAGHANDA PARA SA TIGDAS
cdc.gov/measles

