

ПІДОЗРЮЄТЕ, ЩО ДИТИНА ЗАХВОРИЛА НА КІР?

Що робити, якщо ви підозрюєте в дитини кір

Кір зазвичай починається з високої температури, кашлю, нежитю та почервоніння очей, а згодом з'являється висип. Якщо в кого-небудь із членів сім'ї з'явилися симптоми кору, дотримуйтеся рекомендацій нижче.

Ізольуйте хворого від здорових членів сім'ї.

Усі співмешканці хворого мають залишатися вдома, щоб не заразити сусідів або інших людей за межами вашого помешкання.

Негайно зателефонуйте лікарю або в лікарню та повідомте, що ваш співмешканець, імовірно, захворів на кір. Медичний працівник підкаже, що робити далі.



Коли слід звернутися до відділення невідкладної допомоги

Якщо стан хворого швидко погіршується або в нього з'явився будь-який із симптомів нижче, негайно відвезіть його до відділення невідкладної допомоги лікарні.

НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ.



Утруднене (або прискорене) дихання



Біль під час дихання або кашлю



Зневоднення (сухість у носі та роті, рідше сечовипускання, плач без сліз)



Висока температура або головний біль, що не минають



Сплутаність свідомості, зниження пильності або сильна слабкість



Посиніння ділянки навколо рота, млявість або труднощі з годуванням (у дітей молодшого віку)

Попросіть кого-небудь зателефонувати в лікарню перед вашим візитом. Повідомте персонал, що дитина може бути хворою на кір.

ДОКЛАДНІШЕ ПРО КІР
cdc.gov/measles

