

QUÝ VỊ CHO RẰNG CON MÌNH ĐÃ MẮC BỆNH SỞI?


Cần làm gì nếu quý vị nghĩ con mình mắc bệnh sởi

Bệnh sởi thường bắt đầu với các triệu chứng sốt, ho, sổ mũi và mắt đỏ, sau đó xuất hiện phát ban. Nếu có người trong gia đình có các triệu chứng của bệnh sởi:

Giữ người bệnh tránh xa các thành viên trong gia đình chưa bị bệnh.

Mọi người trong nhà nên ở nhà để tránh lây bệnh cho hàng xóm hoặc những người bên ngoài gia đình.

Gọi ngay cho bác sĩ hoặc bệnh viện để thông báo rằng có người trong nhà mắc bệnh sởi. Họ sẽ hướng dẫn quý vị các bước cần thực hiện.



Khi nào cần đến phòng cấp cứu

Nếu tình trạng của người bệnh trở nặng nhanh chóng hoặc xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào được liệt kê bên dưới, hãy đưa họ đến khoa cấp cứu của bệnh viện ngay lập tức.

ĐỪNG CHỜ ĐỢI.



Khó thở
(hoặc thở nhanh hơn bình thường)



Đau khi thở hoặc khi ho



Mất nước
(mũi và miệng khô, đi tiểu ít hơn bình thường, khóc không có nước mắt)



Sốt hoặc đau đầu không thuyên giảm



Lú lẫn, giảm tỉnh táo hoặc suy nhược nghiêm trọng



Vùng quanh miệng tím tái, ít năng lượng hoặc khó bú/ăn uống
(đối với trẻ nhỏ)

Hãy nhờ ai đó gọi điện trước khi quý vị đến. Thông báo cho bệnh viện biết có một người nghi mắc bệnh sởi đang trên đường đến.

SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI BỆNH SỞI
cdc.gov/measles

